

# Tabela Herpetofauna



Lista das 68 espécies da herpetofauna registradas na área de estudo, sendo identificadas 38 espécies de anfíbios (uma com categoria de ameaça) e 30 espécies de répteis (uma com categoria de ameaça).

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<b>CLASSE AMPHIBIA</b>				
<b>ORDEM ANURA</b>				
<b>Família Brachycephalidae</b>				
<i>Ischnocnema izecksohni</i> (Caramaschi and Kisteumacher, 1989)	rã	-	-	-
<i>Ischnocnema juipoca</i> (Sazima and Cardoso, 1978)	rã	-	-	-
<b>Família Bufonidae</b>				
<i>Rhinella crucifer</i> x <i>R. ornata</i>	sapo-cururu	-	-	-
<i>Rhinella diptycha</i> (Cope, 1862)	sapo-boi	-	-	-
<i>Rhinella rubescens</i> (Lutz, 1925)	sapo-vermelho	-	-	-
<b>Família Centrolenidae</b>				
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	perereca-de-vidro	-	-	-
<b>Família Craugastoridae</b>				
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã	-	-	-
<b>Família Cycloramphidae</b>				
<i>Thoropa megatympanum</i> (Caramaschi and Sazima, 1984)	rã-da-pedra	-	-	-
<i>Thoropa miliaris</i> (Spix, 1824)	rã-da-pedra	-	-	-
<b>Família Hylidae</b>				

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Boana albopunctata</i> (Spix, 1824)	perereca	-	-	-
<i>Boana crepitans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	-	-	-
<i>Boana faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo-martelo	-	-	-
<i>Boana lundii</i> (Burmeister, 1856)	perereca	-	-	-
<i>Boana aff. polytaenia</i>	perereca-de-pijama	-	-	-
<i>Bokermannohyla gr. circumdata</i>	perereca	-	-	-
<i>Bokermannohyla feioi</i> (Napoli & Caramaschi, 2004)	perereca	-	-	-
<i>Bokermannohyla martinsi</i> (Bokermann, 1964)	perereca	✓	-	-
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca-de-moldura	-	-	-
<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	perereca-de-ampulheta	-	-	-
<i>Dendropsophus seniculus</i> (Cope, 1868)	perereca	-	-	-
<i>Scinax cf. similis</i>	perereca	-	-	-
<i>Scinax fuscovarius</i> (Lutz, 1925)	perereca	-	-	-
<i>Ololygon longilinea</i> (Lutz, 1968)	perereca	-	-	-
<i>Ololygon luizotavioi</i> (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)	perereca	-	-	-
<b>Família Leptodactylidae</b>				
<i>Adenomera thomei</i> (Almeida & Angulo, 2006)	rãzinha	-	-	-
<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	rã-assobiadora	-	-	-
<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)	rã-pimenta	-	-	-
<i>Leptodactylus luctator</i> (Hudson, 1892)	rã-manteiga	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	rã	-	-	-
<i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)	rã-assobiadora	-	-	-
<i>Physalaemus centralis</i> (Bokermann, 1962)	rãzinha	-	-	-
<i>Physalaemus cuvieri</i> (Fitzinger, 1826)	rã-cachorro	-	-	-
<i>Physalaemus marmoratus</i> (Reinhardt and Lütken, 1862)	rãzinha	-	-	-
<b>Família Microhylidae</b>				
<i>Elachistocleis cesarii</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)	rã	-	-	-
<b>Família Odontophrynidae</b>				
<i>Odontophrynus cultripes</i> (Reinhardt and Lütken, 1862)	sapo	-	-	-
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1824)	sapo-de-chifre	-	-	-
<b>Família Phyllomedusidae</b>				
<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> (Boulenger, 1882)	perereca-verde	-	-	-
<b>ORDEM GYMNOPTIONA</b>				
<b>Família Siphonopidae</b>				
<i>Luetkenotyphlus brasiliensis</i> (Lütken, 1851)	cecília	-	-	-
<b>CLASSE REPTILIA</b>				
<b>ORDEM SQUAMATA</b>				
<b>Família Amphisbaenidae</b>				
<i>Amphisbaena alba</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cega	-	-	-
<i>Amphisbaena dubia</i> (Müller, 1924)	cobra-cega	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<b>Família Gymnophthalmidae</b>				
<i>Cercosaura quadrilineata</i> (Boettger, 1876)	lagarto	-	-	-
<i>Ecpleopus gaudichaudii</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagartinho	-	-	-
<b>Família Leiosauridae</b>				
<i>Enyalius bilineatus</i> (Duméril & Bibron, 1837)	lagarto	-	-	-
<b>Família Mabuyidae</b>				
<i>Notomabuya frenata</i> (Cope, 1862)	calango-liso	-	-	-
<b>Família Teiidae</b>				
<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	calango-verde	-	-	-
<i>Ameivula cipoensis</i> (Arias, Carvalho, Zaher & Rodrigues, 2014)	lagarto	-	-	-
<i>Salvator merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	teiú	-	-	-
<b>Família Tropiduridae</b>				
<i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)	calango	-	-	-
<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied-neuwied, 1820)	calango	-	-	-
<b>Família Boidae</b>				
<i>Epicrates crassus</i> (Cope, 1862)	salamanta	-	-	-
<b>Família Colubridae</b>				
<i>Tantilla boipiranga</i> (Sawaya & Sazima, 2003)	cobra-vermelha	✓	-	-
<b>Família Dipsadidae</b>				
<i>Apostolepis assimilis</i> (Reinhardt, 1861)	falsa-coral	-	-	-

Táxon	Nome popular	Categoria de Ameaça		
		Global	Nacional	Estadual
<i>Atractus pantostictus</i> (Fernandes & Puerto, 1993)	cobra-da-terra	-	-	-
<i>Dibernardia affinis</i> (Günther, 1858)	cobra	-	-	-
<i>Dipsas mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	-	-	-
<i>Echivanthera melanostigma</i> (Wagler in Spix, 1824)	cobra	-	-	-
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	falsa-coral	-	-	-
<i>Erythrolamprus miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	-	-	-
<i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	-	-	-
<i>Erythrolamprus typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-verde	-	-	-
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dormideira	-	-	-
<i>Oxyrhopus guibei</i> (Hoge & Romano, 1977)	falsa-coral	-	-	-
<i>Oxyrhopus trigeminus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	falsa-coral	-	-	-
<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1870 "1869")	falsa-jararaquinha	-	-	-
<i>Xenodon merremii</i> (Wagler in Spix, 1824)	boipeva	-	-	-
<b>Família Viperidae</b>				
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	-	-	-
<i>Bothrops neuwiedi</i> (Wagler in Spix, 1824)	jararaca-pintada	-	-	-
<i>Crotalus durissus</i> (Linnaeus, 1758)	casavel	-	-	-